



**COLORE** Parte frontale del capo e lati bianchi, nuca nera. Dorso e ali grigie, petto e ventre bianco-grigiastro. Zampe giallo-grigie e becco diritto giallo-grigio. Volo con battiti lenti, ali fortemente curvate.

**HABITAT** Nidifica in garzaie su alberi d'alto fusto nei pressi di laghi, risaie, paludi e incolti umidi.

**PAESI IN CUI VIVE** È presente in tutta Europa con l'eccezione dei paesi nordici. Con l'arrivo dell'inverno si sposta verso l'ovest dell'Europa.

Negli anni '70 era presente in Lombardia con tre colonie, divenute 68 nel 2008. Anche nel bergamasco è in rapido aumento e sta colonizzando i fondovalle con prevalenza quello seriano. Dal 2009 è presente nel parco comunale di Verdello e nel 2013 sono stati conteggiati 17 nidi attivi in data 22 marzo.

**DI COSA SI NUTRE** Pesci, anfibi e rettili rientrano nella sua dieta. Aspetta paziente e immobile presso le rive di stagni, rogge e fiumi le prede, che infilza rapidamente con il lungo becco.

**QUANTE UOVA DEPONE** Depone dalle 1 a 6 uova in un nido a piattaforma composto da rami, sulle cime degli alberi. Incubazione a cura di entrambi i genitori per 25-28 gg e involo a 50 gg. Una covata annua già da febbraio, raramente due.

**PESO** 1120-1970 grammi

**LUNGHEZZA** 90-98 cm; apertura alare 160-175 cm

**CURIOSITÀ** Si riposa su una zampa sola con la testa raccolta e appena si sente minacciato allunga il collo pronto per involarsi.



**COLORE** Lo dice il nome: ha il capo nero. Ma questo è valido solo per il maschio, la femmina infatti ha il capo bruno-rossiccio. Dorsò grigio-verde e ventre grigio opaco. I giovani hanno capo bruno, somigliando così alla femmina.

**HABITAT** Nidifica in ambienti boscati ombreggiati e giardini con denso sottobosco, parchi e giardini.

**PAESI IN CUI VIVE** È presente in tutta Europa e in inverno si sposta nell'ovest del continente. In provincia di Bergamo occupa tutti i settori con il limite delle zone boscate in montagna e dalla disponibilità di habitat confacenti in pianura, corrispondenti a resti di boschi lungo i maggiori corsi d'acqua.

**DI COSA SI NUTRE** Ha una dieta basata prevalentemente in insetti, ma tra l'estate e la primavera si nutre di bacche e frutti.

**QUANTE UOVA DEPONE** Depone dalle 3 alle 7 uova in un nido a coppa realizzato con fine materiale vegetale ma di modesta consistenza. Incubazione a cura di entrambi i sessi per 11-13 gg e involo a 10-15 gg.

**PESO** 12-28 grammi

**LUNGHEZZA** 13.5-15 cm; apertura alare 20-23 cm

**CURIOSITÀ** Il consumo del territorio e l'eliminazione di siepi nelle zone agricole e lungo le rogge sono una seria minaccia alla sua conservazione.



**COLORE** È inconfondibile per la faccia rossa. Ha il resto del capo nero e bianco, ali nere con una ampia barra alare gialla. Coda nera con macchie bianche. I giovani hanno il capo grigio-marrone striato.

**HABITAT** Nidifica in ambienti boscati aperti e alberati, parchi e giardini. In inverno si sposta nell'Europa del sud e all'ovest.

**PAESI IN CUI VIVE** È presente in tutta l'Europa con l'eccezione dei paesi nordici.

Nel territorio bergamasco occupa i settori della pianura, della fascia collinare ed anche i settori montuosi in aree semiaperte ai margini dei centri abitati.

**DI COSA SI NUTRE** Il suo regime alimentare è basato su piccoli semi che raccoglie dai vegetali, spesso prima della maturazione, grazie alla conformazione del suo becco a pinza. Di indole gregaria, è comune osservarlo in gruppi numerosi alla ricerca di cibo.

**QUANTE UOVA DEPONE** Depone dalle 3 alle 7 uova in un nido a coppa ben intessuta e compatta con materiale fine: muschio, tele di ragno, licheni. Incubazione a cura della femmina per 11-13 gg e involo a 13-18 gg.

**PESO** 14-21 grammi

**LUNGHEZZA** 12-13 cm; apertura alare 21-25 cm

**CURIOSITÀ** Per attirarlo vicino a casa basta mettere a dimora in primavera dei semi di girasole, nell'orto/giardino o anche in vaso. Quando il fiore sarà quasi maturo il cardellino sarà sicuramente presente.

L'agricoltura intensiva e la sottrazione di habitat idonei lo rendono vulnerabile e l'eliminazione di terreni incolti e di vegetazione spontanea rende difficoltoso il sostentamento invernale.



**COLORE** Capo nero con guance bianche, petto giallo attraversato da una striscia nera longitudinale (larga nel maschio e stretta nella femmina). Ha dorso verdastro con ali e coda bluastre, zampe grigie/azzurre. I giovani hanno colori più pallidi, guance gialline e solo breve accenno di striscia nera sul petto.

**HABITAT** Nidifica in vari ambienti boscati (preferibilmente latifoglie), giardini e parchi ricchi di cavità naturali, ma anche in cassette nido.

**PAESI IN CUI VIVE** È presente in tutta Europa. Specie sedentaria con dispersione a breve raggio, è possibile incontrarla tutto l'anno.

Nella bergamasca è presente in tutti i settori, compresi quelli montani fino al limite della vegetazione d'alto fusto.

**DI COSA SI NUTRE** Il regime alimentare è condizionato dalle disponibilità locali; piccoli artropodi e lepidotteri in primavera/estate durante il periodo riproduttivo; semi, frutta, gemme e fonti di cibo rese disponibili dall'uomo in autunno/inverno.

**QUANTE UOVA  
DEPONE** Depone dalle 7 alle 10 uova in un nido all'interno di cavità che può riutilizzare per la seconda covata e negli anni successivi. Le uova sono incubate dalla femmina per 12-15 gg e l'involto avviene dopo 16-22 gg.

**PESO** 14-21 grammi

**LUNGHEZZA** 14, cm; apertura alare 22-25 cm

**CURIOSITÀ** Classica visitatrice delle mangiatoie, è ghiotta di arachidi (non salate), semi di girasole e briciole di dolci.





**COLORE** Piccolo uccello, con lunga coda, presenta una striscia biancastra che attraversa il capo scuro dal becco alla nuca. Ha petto biancastro, dorso scuro e timoniere esterne bianche. Becco conico ma minuscolo. Sessi simili. I giovani hanno anello perioculare rosso anziché giallo come gli adulti. Si possono vedere anche esemplari con tutto il capo bianco anche se questi sono caratteristici dell'Europa del nord.

**HABITAT** Nidifica in vari ambienti boscati, giardini e parchi e zone rurali con ampi filari alberati.

**PAESI IN CUI VIVE** È presente in tutta Europa con l'eccezione dell'estremo nord. Specie sedentaria con dispersione a breve raggio, è possibile incontrarlo tutto l'anno.

Nella bergamasca è presente in tutti i settori con una prevalenza nella pianura nei pressi dei corsi fluviali.

**DI COSA SI NUTRE** È un insettivoro: ragni, afidi, zanzare. Integra in inverno con piccoli semi e parti di frutto (cachi/mele).

**QUANTE UOVA DEPONE** Depone dalle 7 alle 10 uova in un nido globoso con ingresso laterale nella parte superiore, incubate dalla femmina per 13-15 gg. I pulli lasciano il nido dopo 17-19 gg. Il gruppo familiare resta molto unito e si aggrega ad altri conspecifici. In inverno gruppetti anche di 20 soggetti uniti a cince e/o regoli.

**PESO** 7-8 grammi

**LUNGHEZZA** 13-14,5 cm; apertura alare 16-19 cm

**CURIOSITÀ** In inverno è possibile attirare i codibugnoli con mangiatoie rifornite di pezzi di frutta e dolci. La specie risente di inverni particolarmente nevosi e con prolungati periodi di gelo.



**COLORE** Il maschio ha dorso e capo grigio, una striscia bianca in fronte, faccia e collo neri, petto e coda aranciati/rossastri. La femmina è più brunastra; i giovani hanno tutto il piumaggio macchiettato con coda rossastra.

**HABITAT** Nidifica in boschi, giardini e parchi, in cavità naturali o cassette nido

**PAESI IN CUI VIVE** È presente in tutta Europa durante il periodo riproduttivo, più localizzato nel centro/sud dell'Italia e della penisola iberica. Trascorre l'inverno nell'Africa sub sahariana.

Nella bergamasca è presente in tutto il territorio con il limite della vegetazione ed è osservabile dalla seconda metà di aprile fino a settembre/ottobre.

**DI COSA SI NUTRE** È un insettivoro, quindi insetti vari ma dalla fine dell'estate fino all'inverno anche bacche e materiale vegetale.

**QUANTE UOVA DEPONE** In un nido a forma di coppa depone 3/8 uova incubate dalla femmina per 12-14 gg. I giovani vengono nutriti da entrambi i genitori e lasciano il nido dopo 12-15 gg. Solitamente due covate annue. Specie spesso parassitata dal cuculo.

**PESO** 10-18 grammi

**LUNGHEZZA** 13-14,5 cm; apertura alare 20-24 cm

**CURIOSITÀ** La scarsità di incavi nell'edilizia moderna lo sfavorisce, così come la sottrazione di spazi verdi come orti o frutteti. Di contro l'installazione di cassette nido rappresenta una valida azione.



**COLORE** Nera e bianca con lunga coda nera. Presenta riflessi verdi/blu sia sulle ali che sulla coda. Massiccio becco nero. Maschio e femmina sono uguali, così anche i giovani non presentano particolari differenze.

**HABITAT** Nidifica in ambienti alberati aperti, parchi e giardini con grandi alberi.

**PAESI IN CUI VIVE** È presente in tutta Europa ed è sedentaria.

Nella bergamasca occupa tutta la pianura e sta colonizzando le fasce collinari.


**DI COSA SI NUTRE** È un uccello onnivoro legato alle opportunità stagionali. Durante la riproduzione si nutre di piccoli animali invertebrati ma anche piccoli vertebrati tra cui uova e nidiacei di uccelli e arvicole. Negli altri periodi si nutre di bacche, semi e frutta ma anche carogne e rifiuti vari di origine antropica.

**QUANTE UOVA  
DEPONE** In un nido voluminoso tra i rami di un albero o localmente su un traliccio, che viene costruito già da gennaio, depone 3/8 uova. L'incubazione è effettuata dalla femmina per 17-19 gg e i giovani si involano dopo 22-30 gg. Una covata annua. Nell'Italia del sud il cuculo dal ciuffo può parassitare il nido.

**PESO** 190-270 grammi

**LUNGHEZZA** 40-51 cm; apertura alare 52-60 cm

**CURIOSITÀ** È una specie in espansione e sebbene nella bergamasca sia soggetta a periodici piani primaverili di controllo delle popolazioni sembra che questo non abbia inciso in modo significativo sulla sua espansione.



**COLORE** Ha un piumaggio bianco con collo e capo neri, entrambi senza penne; massiccio becco nero ricurvo verso il basso. Bordi delle ali nere.

**HABITAT** Nidifica su alberi d'alto fusto in garzaie.

**PAESI IN CUI VIVE** Specie originaria dell'Africa.  
In Italia è presente con popolazioni di origine afulga o provenienti da immissioni.  
  
In provincia di Bergamo la sua presenza è legata alla popolazione proveniente dal parco faunistico "Le Cornelle" di Valbrembo e diffusi in principio nelle vicinanze (lungo il corso del fiume Brembo) e successivamente in ampie zone della pianura. Nel comune di Verdello nidifica nella garzaia del parco comunale a fianco dell'airone cenerino.

**DI COSA SI NUTRE** Visibile a gruppi nelle campagne perlustra i terreni arati cercando insetti e lombrichi o lungo corsi d'acqua e rogge alla ricerca di molluschi e anfibi.

**QUANTE UOVA DEPONE** Come l'airone cenerino forma il nido con vari rami su alberi, dove depone fino a 5 uova che vengono incubate da entrambi i sessi.

**LUNGHEZZA** 60-85 cm; apertura alare 110-125 cm

**CURIOSITÀ** Specie che si sta reinselvaticando, non ha nel nostro territorio predatori naturali. La sua diffusione va a discapito delle specie autoctone e sono allo studio varie misure per contenerne il numero.





**COLORE** Presenta dorso verdastro, petto giallo pallido e sopracciglio giallastro; zampe chiare. Maschio e femmina sono identici

**HABITAT** Nidifica ovunque ci sia un albero o un alto cespuglio, anche in parchi e giardini.

**PAESI IN CUI VIVE** È presente in Europa oltre le Alpi fino alle estremità nord. In inverno migra nell’Africa subsahariana compiendo anche 13.000 km. Durante la migrazione può spostarsi anche di 200 km al giorno.  
In Italia è possibile osservarlo solo durante i periodi migratori; febbraio/aprile e fine luglio/settembre.

**DI COSA SI NUTRE** E’ un insettivoro e raccoglie il cibo direttamente dalle foglie di alberi o arbusti, ma cattura anche al volo piccoli insetti. In primavera anche polline e nettare.

**QUANTE UOVA DEPONE** Depone dalle quattro alle sette uova in un nido a coppa chiusa anche superiormente con materiale esterno grossolano (foglie e rametti) e più fine internamente (peli e piume).

**PESO** 6-15 grammi

**LUNGHEZZA** 11-12 cm; apertura alare 16-22 cm

**CURIOSITÀ** È uno degli uccelli più comuni del nord Europa.



**COLORE** Il maschio è completamente nero con becco giallo/arancio, la femmina marrone con becco scuro, gola leggermente bianca-brunstra e petto striato. I giovani assomigliano alla femmina ma sono più macchiettati.

**HABITAT** Nidifica in ambienti diversi, naturali o artificiali, purché vi siano alberi o cespugli. È facile vederlo a terra nei prati/giardini in cerca di cibo o sulle cime di alberi, antenne, in canto.

**PAESI IN CUI VIVE** È presente in tutta Europa con l'eccezione delle zone più a nord. In inverno le popolazioni nordiche si spostano a sud quindi non è detto che i merli che vediamo in inverno siano gli stessi dell'estate.

Nella provincia di Bergamo è presente ovunque con l'eccezione dei settori alpini privi di vegetazione d'alto fusto.

**DI COSA SI NUTRE** È un insettivoro, specie nel periodo primaverile/estivo mentre in autunno/inverno si nutre di bacche.

**QUANTE UOVA DEPONE** Depone dalle 2 alle 6 uova già da febbraio nelle aree urbane, da marzo/aprile nelle altre zone, in un nido a forma di coppa nascosto nelle siepi o sugli alberi. È la femmina che sta in cova per 12-16 gg e i piccoli si involano dopo 12-20 gg. Due/tre covate annue. È una delle specie spesso parassitata dal cuculo.

**PESO** 80-120 grammi

**LUNGHEZZA** 23,5-29 cm; apertura alare 34-38 cm

**CURIOSITÀ** Molto confidente, frequenta anche le mangiatoie invernali; basta offrirgli biscotti in briciole, arachidi (non salate), uvetta. Se si dispone di un terrazzo basta mettere un sottovaso con dell'acqua per vederlo bere o farsi un bagno.



**COLORE** Il nostro “passero” è una specie derivata dal mescolamento tra la passera sarda (che presenta petto e ventre con un marcato disegno nero) e la passera oltremontana (capo e fianchi del collo grigi). Il maschio ha capo marrone e fianchi del collo biancastri, dorso marrone nero; la femmina ha colori più uniformi grigio/brunastri. I giovani assomigliano alla femmina.

**HABITAT** Fortemente legata agli insediamenti umani, è diventata rara in ambienti aperti.

**PAESI IN CUI VIVE** La sua presenza è limitata alla sola Italia con l’eccezione della Sicilia e Sardegna.

Nella bergamasca la sua presenza è legata alle zone fortemente antropizzate ed è più diffusa in pianura mentre diventa più rara nelle parti superiori delle vallate.

**DI COSA SI NUTRE** Avendo un becco grosso, si nutre di semi anche coltivati, foraggio per animali d’allevamento ed occasionalmente anche fiori e frutti. Non disdegna anche insetti o piccoli anfibi e rettili.

**QUANTE UOVA  
DEPONE** Depone 4-8 uova in un nido voluminoso a palla sia su alberi che all’interno di cassette nido o cavità naturali, sotto coppi o tegole. Incubazione a cura di entrambi i genitori per 11-15 gg e involo a 11-17 gg. Due covate annue ma spesso tre e non di rado anche quattro.

**PESO** 24-33 grammi

**LUNGHEZZA** 15 cm; apertura alare 23-26 cm

**CURIOSITÀ** Sebbene gli insediamenti umani siano in continua espansione, la specie è in contrazione a causa di diversi fattori: minori disponibilità di siti di nidificazione in cavità murarie, competizione con altre specie urbane (piccione e storno) e inquinamento urbano.

Pur non essendo troppo confidente, basta mettere una mangiatoia invernale con semi/biscotti per attirarlo. Attenzione, poiché si muove a gruppetti e nel giro di breve tempo consuma tutto il cibo che gli si offre. Una ciotola con dell’acqua serve per bere/bagno quasi sempre.



**COLORE** Presenta tutto il capo marrone, lati del capo bianchi con grande macchia nera sulla guancia, dorso marrone nero. Sessi simili; i giovani hanno colori più spenti e guance grigie.

**HABITAT** Nidifica in campagna e centri abitati piccoli e medi evitando le aree centrali di città e metropoli. Nidi all'interno di cavità naturali o nidi artificiali.

**PAESI IN CUI VIVE** Specie sedentaria presente in tutta Europa con l'eccezione dell'estremo nord.

Nella bergamasca è presente in tutta la pianura e nelle fasce collinari con vuoti di areale nelle alte Orobie.

**DI COSA SI NUTRE** Come la passera d'Italia è un granivoro. Si alimenta in gruppo a terra cercando piccoli semi di piante erbacee annuali ma anche piccoli insetti con cui alimenta inizialmente i nidiacei.

**QUANTE UOVA DEPONE** In un nido voluminoso (tende a riempire le cassette nido con materiale vegetale) depone 2-8 uova incubate da entrambi per 11-15 gg e involo a 13-16 gg.

**PESO** 16-27 grammi

**LUNGHEZZA** 14 cm; apertura alare 20-22 cm

**CURIOSITÀ** Molto gregaria e chiassosa, la si osserva in gruppetti sia durante il periodo di corteggiamento sia mentre si alimenta o nei dormitori. Un tempo molto diffusa in ambienti agricoli, presenta uno status di conservazione sfavorevole a causa dei drastici cambiamenti nei metodi di conduzione delle attività agricole oltre che alla minor disponibilità di siti di nidificazione in cavità murarie.



**COLORE** Ha un piumaggio interamente scuro e gola biancastra; sessi simili. Tarsi cortissimi e unghie molto affilate. Il giovane presenta una sottile marginatura chiara delle copritrici alari.

Molto gregario, vola velocissimo con frenetici battiti alari lanciando grida stridenti.

**HABITAT** Nidifica in città e paesi, in cavità di edifici storici ed in “piccionaie” o “rondonaie”.

**PAESI IN CUI VIVE** Arriva in Europa per la riproduzione in aprile e ritorna nell’Africa sub sahariana già da agosto.

Nella bergamasca la sua presenza è legata alle zone fortemente antropizzate ed è più diffusa in pianura, mentre diventa più localizzata e commisurata alle dimensioni dei centri abitati. Risulta assente nelle alte valli.

**DI COSA SI NUTRE** Raccoglie esclusivamente in volo il cibo, che è composto da artropodi alati o altri piccoli insetti (tra i 2-12 mm) trasportati dalle correnti aeree.

**QUANTE UOVA DEPONE** In un nido essenziale posto nelle cavità depone 1-4 uova; incubazione a cura di entrambi per 18-24 gg e involo a 37-56 gg.

**PESO** 32-56 grammi

**LUNGHEZZA** 17-18,5 cm; apertura alare 42-48 cm

**CURIOSITÀ** Conduce la propria vita esclusivamente in volo, toccando il “suolo” (le pareti in prossimità delle cavità) solo per la riproduzione. Il riposo notturno viene effettuato in aria a quote tra i 1000-2000 m. Il legame di coppia viene mantenuto per più anni così come la fedeltà al luogo riproduttivo.





**COLORE** Presenta capo grigio brunastro, gola bianca, dorso bruno oliva e margini delle ali color ruggine. Maschio e femmina distinguibili solo se visti in coppia per sfumature del piumaggio. I giovani assomigliano alla femmina.

**HABITAT** Nidifica in aree aride o semiaride con cespugli, pascoli con arbusti. In pianura padana anche lungo corsi d'acqua ove ci siano macchie arbustive rare.

**PAESI IN CUI VIVE** Presente in tutta Europa durante il periodo di riproduzione mentre trascorre l'inverno a sud del Sahara.

Nel territorio bergamasco è più concentrata nella fascia collinare mentre in pianura la sua presenza è limitata a biotipi di piccole dimensioni.

**DI COSA SI NUTRE** La sua dieta si basa prevalentemente su insetti e artropodi, e occasionalmente integra con bacche e frutti.


**QUANTE UOVA DEPONE** Depone 4-8 uova in un nido a coppa tra gli steli della vegetazione erbacea e rami di cespugli. Entrambi i sessi provvedono all'incubazione per 11-13 gg e involo a 10-14 gg. Spesso due covate.

**PESO** 12-19 grammi

**LUNGHEZZA** 13-15 cm; apertura alare 18-23 cm

**CURIOSITÀ** Pur godendo di uno status favorevole, fenomeni di siccità e desertificazione nelle aree di svernamento la stanno penalizzando.

In bergamasca l'eliminazione di siepi che delimitano le zone coltivate ed il consumo del territorio per infrastrutture viarie ne limitano la presenza.



**COLORE** Colorazione molto scura con riflessi verdi-blu-violacei. Le penne del corpo sono molto appuntite e sono orlate di chiaro. Durante il periodo riproduttivo la base del becco diventa grigia/azzurra nei maschi e rosata nelle femmine. I giovani hanno una colorazione grigio/marrone ma diventano simili agli adulti dopo la muta completa autunnale. Il becco è lungo e appuntito.

**HABITAT** Nidifica in ambienti naturali ricchi di cavità vicini a prati e pascoli ma anche in parchi.

**PAESI IN CUI VIVE** È presente in tutta Europa e si sposta nel periodo invernale nell'ovest del continente fino all'Africa mediterranea.

**DI COSA SI NUTRE** È un opportunista in grado di sfruttare le opportunità locali e stagionali. È un onnivoro, passa dagli insetti ai frutti (ad es. ciliegie e fichi in estate e cachi in inverno).

**QUANTE UOVA  
DEPONE** Dalle quattro alle sei uova vengono deposte in cavità naturali ma anche in cassette nido, spesso due covate. L'incubazione è a cura della femmina per 11-15 gg e involo dopo 12-22 gg.

**PESO** 52-100 grammi

**LUNGHEZZA** 21 cm; apertura alare 37-42 cm

**CURIOSITÀ** Al di fuori del periodo riproduttivo diventa gregario sia nel cercare cibo che nel riposo notturno. Si riunisce in gruppi di migliaia di individui generando nuvole dalle forme bizzarre nel cielo, ma anche come difesa dagli attacchi dei predatori, disorientandoli.



**COLORE** Il suo piumaggio è molto criptico con parti superiori grigiastre, gola color camoscio e petto chiaro molto barrato, il becco è corto. Maschio e femmina sono simili.

**HABITAT** Frequenta ambienti alberati e boscati ma è presente anche in parchi e giardini.

**PAESI IN CUI VIVE** È presente in tutta Europa durante il periodo riproduttivo tra marzo/ottobre e migra in Africa e Asia al di sopra dell'equatore nel periodo invernale. Risulta fedele sia ai siti di nidificazione che a quelli di svernamento.

Nella provincia di Bergamo è presente nella fascia pedemontana e collinare e solo in alcuni settori della pianura.

**DI COSA SI NUTRE** Le formiche sono il suo alimento principale, ma anche imenotteri e artropodi.

**QUANTE UOVA DEPONE** Sei/dieci uova vengono deposte in cavità di alberi, che non scava a differenza degli altri picidi, ma anche all'interno di muri o nidi artificiali. Entrambi i sessi provvedono all'incubazione per 11-14 gg e involo a 17-22 gg. Raramente viene parassitata dal cuculo.

**PESO** 34-46 grammi

**LUNGHEZZA** 16-17 cm; apertura alare 25-27 cm

**CURIOSITÀ** In condizioni di estremo pericolo assume un atteggiamento "terrifico" sollevando le penne del vertice ma soprattutto allungando il collo e torcendo il capo con movimenti serpentiformi. Se sorpreso all'interno del nido esibisce soffi.

È in forte decremento per riduzione dell'habitat e per l'agricoltura intensiva.



**COLORE** Piumaggio grigio, presenta un piccolo collare scuro nella parte posteriore del collo, ha le estremità delle ali scure mentre le timoniere (penne della coda) esterne sono bianche. Maschio e femmina sono molto simili.

**HABITAT** Molto legata agli insediamenti umani e alle zone agricole e rurali.

**PAESI IN CUI VIVE** In origine il suo areale era concentrato nell'Asia centro-meridionale ma nel tempo si è diffusa in tutta Europa specie nelle zone pianeggianti ed è presente tutto l'anno.

Nella bergamasca occupa tutta la pianura fino alla fascia pedemontana e collinare. Degli anni '80 è la sua prima comparsa in Bergamo, con una progressiva diffusione. Nel 2010 è stata segnalata anche a Schilpario.

**DI COSA SI NUTRE** Il suo regime alimentare si basa esclusivamente su vegetali e semi che ricerca a terra. I nidiacei vengono nutriti con il "latte" secreto dall'ingluvie (il gozzo degli uccelli).

**QUANTE UOVA DEPONE** Due uova vengono deposte da febbraio a luglio in un nido approssimativo composto con rametti nei luoghi più disparati, alberi ma anche vasi di fiori o antenne. Incubazione per 15-16 gg a cura di entrambi e involo a 15-19 gg.

**PESO** 125-260 grammi

**LUNGHEZZA** 31-33 cm; apertura alare 47-50 cm

**CURIOSITÀ** Al di fuori del periodo riproduttivo è molto gregaria specialmente nei pressi di magazzini di granaglie.

Un sottovaso con dell'acqua durante il periodo primaverile/estivo la attira sicuramente.

## VERDONE (CHLORIS CHLORIS)

## FRINGILLIDE



**COLORE** Piumaggio grigio, giallo/verde; il maschio ha il corpo giallo verde e presenta i margini gialli delle penne delle ali e della coda, la femmina è più uniforme con colori più tenui. I giovani hanno colori slavati e petto grigio-bianco striato.

**HABITAT** Nidifica in ambienti alberati, in aree pianeggianti o collinari; parchi, giardini.

**PAESI IN CUI VIVE** È presente in tutta Europa ad eccezione dell'estremo nord durante il periodo riproduttivo (marzo/giugno) e si sposta nel sud Europa/nord Africa tra settembre e novembre.

In provincia di Bergamo occupa tutti i settori pianeggianti, collinari e prealpini.

**DI COSA SI NUTRE** Dalla forma del becco, robusto e conico, si comprende che è un granivoro quindi semi, girasole e cardo ma anche gemme e germogli. Nutre i piccoli nei primi giorni di vita con piccoli insetti e afidi.

**QUANTE UOVA DEPONE** Dalle 3 alle 7 uova vengono deposte in un nido a coppa, costruito dalla sola femmina, ben celato tra i rami degli alberi. È la femmina che cova per 11-15 gg e involo dopo 14-15 gg. Solitamente due covate annue tra aprile-giugno/luglio.

**PESO** 19-30 grammi

**LUNGHEZZA** 14-16 cm; apertura alare 24-27 cm

**CURIOSITÀ** Il maschio canta dalla cima di alberi con postura eretta ma è possibile osservarlo anche a terra in cerca di cibo. I verdoni possono essere nutriti nella stagione invernali con semi di girasole posti in una mangiatoia e si dimostrano aggressivi nei confronti di altri uccelli.





**COLORE**      Piumaggio giallo/verde, il maschio ha il petto completamente giallo così anche la fronte, la femmina ha colori più modesti e più mimetici; i giovani sono più striati, sarà solo dopo la muta autunnale che mostreranno i caratteri del maschio o della femmina.

**HABITAT**      Nidifica in ambienti semi-alberati; parchi, giardini. Evita le zone troppo boschive.

**PAESI IN CUI VIVE**      È presente in tutta l'Europa ad eccezione dei paesi nordici durante il periodo riproduttivo (marzo/giugno) e si sposta nel sud Europa/nord Africa tra settembre e novembre.

Nella provincia di Bergamo è presente in quasi tutti i settori, dalla pianura fino a quote superiori ai 1500 m, mentre nel periodo invernale occupa solamente zone della pianura provviste di spazi incolti idonei al suo sostentamento.

**DI COSA SI NUTRE**      Dalla forma del becco, piccolo e tozzo si comprende che è un granivoro, quindi piccoli semi di specie erbacee con i quali nutre anche i piccoli.

**QUANTE UOVA  
DEPONE**      Dalle 3 alle 7 uova vengono deposte in un nido a coppa ben celato tra i rami degli alberi. Incubazione a cura della femmina per 13 gg e involo dopo 15 gg. Solitamente due covate annue ma non raramente anche tre tra marzo-giugno/luglio.

**PESO**      11-13 grammi

**LUNGHEZZA**      11-12 cm; apertura alare 20-23 cm

**CURIOSITÀ**      Il maschio canta sia in volo che da posato, è possibile osservarlo in canto sulle antenne o sui cavi elettrici, il volo ricorda quello delle farfalle.  
Una ciotola d'acqua sul terrazzo durante il periodo estivo può essere un modo per osservarlo più da vicino.